

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP21-6-68793730

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 au BULLETIN N° 93 de JUIN 1968

17 Juin 1968

## V I G N E

### AVERTISSEMENTS

#### Mildiou

En raison des pluies importantes de ces derniers jours, il est nécessaire de renouveler la protection sur l'ensemble du vignoble, d'autant qu'il existe des foyers en divers points.

#### Vers de la grappe

Dans les situations tardives, ajouter un produit curatif à la bouillie antimildiou.

### INFORMATION

#### Oïdium

Ajouter à la bouillie un soufre mouillable ou du Dinocap.

## A R B R E S F R U I T I E R S

### AVERTISSEMENTS

#### Tavelures du pommier et du poirier

Dans les régions où les pluies du 14 au 17 juin ont été supérieures à 15 mm, renouveler le traitement antitavelure dans les vergers où la maladie existe. Les projections d'ascospores étant terminées, les contaminations primaires ne sont plus possibles ; les repiquages de la maladie ne se réalisant maintenant qu'à partir de taches existantes dans le verger.

#### Carpocapse des pommes

Dans les zones particulièrement précoces l'application d'un premier traitement est conseillée avant le 20 juin ; toutefois dans la majorité des cas et en raison des pontes nombreuses observées dans les derniers jours de la première quinzaine du mois, une protection des fruits devra être assurée entre le 23 et le 28 juin.

/...

## GRANDE CULTURE

### AVERTISSEMENT

#### Mildiou de la pomme de terre

Les abondantes précipitations enregistrées depuis trois jours ont lessivé le traitement recommandé par notre avis du 10 juin.

Malgré le difficile accès des cultures, il importe de renouveler leur protection dès que possible et au plus tard pour le 22 juin. Les pommes de terre qui ne seraient pas protégées pour cette date risquent de subir de graves attaques.

### INFORMATIONS

#### Phytonome de la luzerne

Sur les premières coupes non récoltées quelques dommages se remarquent, occasionnés par des larves déjà fortes. Les attaques sont généralement bénignes sur les pousses de seconde coupe des luzernes récoltées en vue de la déshydratation.

Pour les cultures destinées à la production de foin, intervenir éventuellement si le départ des nouvelles pousses parait gêné par les attaques des larves. Les produits couramment utilisés sont actifs mais forcer les doses habituelles à mettre en oeuvre avec un minimum d'eau.

#### Tordeuses du pois

Outre les produits précédemment indiqués, peuvent être mis en oeuvre contre les tordeuses des pois :

- diéthion - 1.000 g. de matière active à l'hectare
- phosalone - 600 g. " " " "

Ces deux produits sont reconnus non dangereux pour les abeilles.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire "CHAMPAGNE"